

¿A quién se le debe realizar una prueba de hepatitis C?

- Personas que han recibido intervenciones médicas o dentales en entornos de asistencia médica en los que las prácticas de control de infecciones están por debajo de los estándares.
- Personas que han recibido transfusiones de sangre antes del momento en que las pruebas serológicas del VHC en los donantes de sangre se iniciaran, o en países en los que las pruebas serológicas de VHC de las donaciones de sangre no se llevan a cabo.
- Personas que se inyectan drogas.
- Personas que han tenido tatuajes, perforaciones corporales (piercings) o procedimientos de escarificación en lugares en los que las prácticas para el control de infecciones están por debajo de los estándares.
- Niños nacidos de madres infectadas con VHC.
- Personas con infección por VIH o hepatitis B.
- Personas que han utilizado drogas intranasales.
- Población privada de la libertad y personas encarceladas previamente.
- Cualquier persona que haya nacido entre 1945 y 1965 ^a.
- Cualquier persona con pruebas hepáticas anormales o con una enfermedad hepática.
- Trabajadores de la salud o miembros de seguridad pública (ej. Oficiales de servicio penitenciario o policía) que hayan estado en contacto con sangre en el trabajo a través de lesiones por pinchazo o con un objeto punzante.
- Cualquier persona que se haya sometido a hemodiálisis.
- Personas que recibieron transfusiones en Colombia hasta 1996.

a. De acuerdo con los factores de riesgo considerados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social e Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Vía clínica para el tratamiento de hepatitis C crónica, segunda edición. Bogotá; 2018.